

O alegere esențială



Erbicid



Ambalat la
5 Litri

Caracteristici:

Este soluția Syngenta în postemergență pentru controlul principalelor buruieni monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale pe care le întâlnim în culturile de cereale. Complementaritatea celor două substanțe active, pinoxaden, recunoscut cu eficacitate superioară împotriva buruienilor graminee, și florasulam, cu efect împotriva buruienilor cu frunză lată, face din Axial One® o excelentă alegere în programul de combatere a buruienilor, printr-o singură trecere.

	Tratament sămânță/ Semănat	Răsărire	Înfrățire	Începutul alungirii paiului	Burduf	Înflorit	Maturitate
		BBCH 09-10	BBCH 21-29	BBCH 30-32	BBCH 40-42	BBCH 60-62	BBCH 90-92
Stadiul de dezvoltare							
Problema							
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale							

Cultura	Spectru de combatere	Doza	Epoca de aplicare	Temp de pauză**
Grâu	Buruieni monocotiledonate anuale Iarba vântului (<i>Apera spica-venti</i>), Odos (<i>Avena fatua</i>) Buruieni dicotiledonate anuale Ruscuță de primăvară (<i>Adonis vernalis</i>), Scânțeiuța (<i>Anagallis arvensis</i>), Romaniță de câmp (<i>Anthemis arvensis</i>), Rapița (<i>Brassica napus</i>), Traista ciobanului (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Albăstretea (<i>Centaurea cyanus</i>), Voinicica (<i>Descurainia sophia</i>), Lipicioasa, Turiță (<i>Galium aparine</i>), Mei păsăresc (<i>Lithospermum arvense</i>), Mușețel (<i>Matricaria chamomilla</i>), Mușețel nemirositor (<i>Matricaria inodora</i>), Floare de Nu-Mă-Uita (<i>Myosotis arvensis</i>), Mac (<i>Papaver rhoeas</i>), Iarbă roșie (<i>Polygonum lapathifolium</i>), Iarbă roșie (<i>Polygonum persicaria</i>), Hrișcă urcătoare (<i>Polygonum convolvulus</i>), Ridichie (<i>Raphanus sativus</i>), Muștar sălbatic (<i>Sinapis arvensis</i>), Gălbenea (<i>Sisymbrium officinale</i>), Rocoină (<i>Stellaria media</i>), Punguliță (<i>Thlaspi arvense</i>).	1 l/ha	postemergent (grâu și orzoaică de primăvară - de la prima frunză desfășurată (BBCH 11) până la apariția frunzei stindard (BBCH 39)	-

**Interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare



Stațiunea Didactică Belciugatele

Aici, în Stațiunea Didactică Belciugatele folosim an de an Axial One® și suntem foarte mulțumiți! Dintre toate buruienile, cele care ne ridică cele mai mari probleme sunt ovăzul sălbatic și iarba vântului, dar cu Axial One® reușim să le ținem foarte bine sub control.

Mădălin Radu, Director Tehnic, Stațiunea Didactică Belciugatele




Erbicide

Contribuția unui adjuvant specific:

Succesul combaterii în postemergență a buruienilor, în special graminee, ține foarte mult de facilitarea pătrunderii rapide a substanței active în țesuturile buruienilor. Pentru a pune în valoare proprietățile produselor din familia **Axial®**, **Syngenta** a dezvoltat un adjuvant specific. Acesta ajută la distribuirea uniformă a substanțelor active, facilitează pătrunderea acestora în plantă și determină astfel o acțiune mai rapidă a produsului.



Absorbție și translocare:




- Substanța activă este absorbită prin toate părțile verzi
- Substanța activă este transportată rapid în plantă acropetal și bazipetal

Fără restricții asupra culturilor următoare într-o rotație normală, (cu sau fără arătură).

În caz de distrugere accidentală a culturii de cereale poate fi semănat grâu de primăvară, orz, orzoaică de primăvară, chiar și porumb dacă se depășește 1 lună până la semănat.

Atenție! A nu se amesteca cu erbicide hormonale (2,4 D, dicamba), produse ce conțin sulf sau îngrășăminte foliare.

Fereastră largă de aplicare



Axial One® poate fi aplicat de la stadiul început înfrățit până la apariția frunzei standard a culturii de cereale. Pentru a obține cele mai bune rezultate din punct de vedere al eficacității produsului și limitarea pierderilor de recoltă datorate de concurența buruienilor se obțin când este aplicat în momentul de sensibilitate maximă a buruienilor (monocotiledonate - început înfrățit și dicotiledonate 4-6 frunze).

Fără restricții în asolament



Axial One® controlează principalele buruieni problemă din cultura de cereale



Avena spp.
(Odos)



*Apera
spica venti*
(larba vântului)



*Galium
aparine*
(Turită)




*Matricaria
spp.*
(Mușețel)



*Papaver
rhoeas*
(Mac roșu)

Eficacitate de peste **90%** împotriva majorității buruienilor



*rezultate din loturile de cercetare Syngenta

Substanță activă	Clasificare	Formulare	Număr de omologare
pinoxaden 45g/l florasulam 5g/l cloquintocet-mexil 11,25 g/l (safener)	ATENȚIE 	Concentrat emulsionabil	2852/ 17.12.2009

Erbicide